

醫心方卷第六

之立子咸專一而文一又言亦及有果



醫心方卷第六

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治胃痛方第一

治脇痛方第二

治心痛方第三

治腹痛方第四

治心腹疼痛方第五

治心腹脹滿方第六

治卒腰痛方第七

治緊腰痛方第八

治腎著腰痛方第九

治肝病方第十

治心病方第十一

治脾病方第十二

治肺病方第十三

治腎病方第十四

治大腸病方第十五

治小腸病方第十六

治膽病方第十七

治胃病方第十八

治膀胱病方第十九

治三焦病方第二十

治氣病方第二十一

治脉病方第二十二

治筋病方第二十三

治骨病方第二十四

治髓病方第二十五

治皮病方第二十六

治完病方第二十七

治胃痛方第一

病源論云胃脇痛者由膽与肝及腎之文脉虛為

寒氣所乘故也此三經之文脉並脩行胃脇耶氣乘



治筋病方第廿三

治骨病方第廿四

治髓病方第廿五

治皮病方第廿六

治完病方第廿七

治胃痛方第一

病源論云胃腸痛者由膽與肝都最及之文脈虛為

寒氣所乘故也此三經之文脈並脩行胃腸耶氣乘

於胃腸故傷其經脈耶氣之與正氣交擊故令胃

腸相引而急痛也

葛氏方治胃痺之病令人心符部及腹內結病也中堅痞急痛肌中苦

痺絞急如刺不得俛仰其胃前皮胃痛不得犯胃

滿短氣啞啞引痛煩悶白汗出或微引背脅不舒

之數日致人方

橘皮一升枳實四枚生薑半斤水四升煮取二升分

為再服令藥小品方枳實  
三兩水五升

又方若已差復更發者取シノノネ並根五斤搗ハキシホ取汁飲之

五愈

千金方云胃痺之病令人心カラクキ中堅痞急痛肌中苦痺絞

急如刺不得俛仰其胃中急滿滿咽塞習ノムリ痺喉中

乾燥時欲嘔吐胃及背引痛シノノネ不得犯胃滿短氣

啞啞引痛煩悶白汗出或微背引痛忽不知治致人方

枳實四枚厚朴三兩シノノネ並白オホシノノネ斤カラハナリ桔樓子一枚

桂心一兩五味水七升煮取二升半分再服

蘇驗方治胸痛連背不得卧方



急如刺不得倪仰其胃中痛如滿咽塞習<sup>ナリ</sup>痒喉中<sup>ナリ</sup>  
乾燥時欲<sup>ナリ</sup>嘔吐胃及背引痛<sup>ナリ</sup>不得<sup>ナリ</sup>化胃滿短氣<sup>ナリ</sup>

啖<sup>ナリ</sup>引痛煩悶日汗出或微背引痛忽不知治<sup>ナリ</sup>欬人方

枳實四枚 厚朴三兩 薤白<sup>ニツノ不</sup>一斤 桔樓子一枚<sup>カラハナリ</sup>

桂心一兩 五味水七升煮取二升半分再服

錄驗方治胸痛達背不得卧方

大枯樓實一枚<sup>ホソクア</sup> 薤白三升<sup>切</sup> 半夏半升<sup>洗</sup> 生薑六兩

凡四物切以漬<sup>白</sup>漿一斗煮取四升一服一升

極要方療胃滿氣<sup>ナリ</sup>脹心腹中冷方

半夏<sup>ホソクア</sup>一升 洗 桂心八兩 生薑一斤

右以水七升煮取二升七合日三服<sup>セツ</sup>

醫門方療冷氣胃中<sup>ナリ</sup>妨滿或痛方

半夏四兩 生薑五兩 厚朴四兩 炙<sup>ナリ</sup>六升煮取二升

去滓分溫二服相去八九里頓服二三劑

治腸痛方第二

病源論云耶氣客於足少陽之絡令人腸痛

葛氏方治脇卒痛如得打方以繩橫度兩乳中間屈<sup>ナリ</sup>

繩從乳橫度以<sup>ナリ</sup>痛脇下灸繩下屈處卅壯

小品方治脇下偏痛茲契其脈弦此寒也當以溫藥

其寒大黃附子湯方大黃三兩附子三枚細辛兩

凡三物以水三升煮取二升分二服

千金方治冷氣脇下往来<sup>ナリ</sup>腸痛引脇背當歸湯方

當歸二兩 吳茱萸二兩 伏苓一兩 桂心二兩



繩從乳橫度以繩下屈處

小品方治脇下偏痛茲契其脈弦此寒也當以溫藥

其寒大黃附子湯方大黃三兩附子二枚細辛兩

凡三物以水三升煮取二升分二服

千金方治冷氣脇下往來腸痛引脇背當歸湯方

當歸二兩吳茱萸二兩伏苓一兩桂心二兩

干薑三兩枳實一兩人參二兩芍藥二兩

大黃二兩甘草二兩

十味以水八升煮取二升半一服八合日三服

佳今案極方有二地又之治兩脇下痛方

契湯漬兩足冷則易

### 治心痛方第三

病源論云心痛者風冷耶氣乘於心也其病發有

死者有不死成痼者心為諸主而藏神其心經不

可傷之而痛為真心痛朝發夕死夕發朝死心

有艾別之絡脈其為風冷所乘不傷於心經者亦令

心痛則下同耳甚故成痼不死

### 葛氏方治卒心痛方

當力以自吐若男子病者令婦人以一坏水与飲

之若婦人病者令男子以一坏水与飲之得新汲井

水尤佳又方吳茱萸五合桂一兩酒二升

煮取一升分二服又方吳茱萸二升生薑四兩

豉一升酒六升煮取二升分三服又方切生薑



意氏方治心氣痛方

當力以自吐若男子病者令婦人以一坏水与飲之若婦人病者令男子以一坏水与飲之得新汲井

水尤佳 又方吳茱萸五合 桂一兩 酒二升

煮取一升分二服 又方吳茱萸二升 生薑四兩

豉一升酒六升煮取二升半分三服 又方切生薑

若干薑半升以水二升煮得一升去滓頓服之

又方取竈中契灰アハヒ覆去灰芥アハヒ燔アハヒ慰心上アハヒ冷復易

錄鈴方治卒心痛方 薑大豆若煮之以囊盛更燔以

熨心上アハヒ冷復易之已慰之豆不可令畜生火等食之即

死 又云治人心痛アハヒ懷アハヒ懷アハヒ情アハヒ悶アハヒ築アハヒ引アハヒ雨アハヒ乳アハヒ立アハヒ或如

判困極桂湯方 桂心半兩 茱萸二升 芍藥三兩

當歸二兩 生薑半斤 凡五物切以水一斗二升煮取四

升服一升日三夜一有驗元生薑用干薑五升代

脩急方治心痛アハヒ作アハヒ塩湯飲三升吐則即老

耆婆方治卒心痛欲死方

吳茱萸三兩 芍藥三兩 桂心三兩

右以淳酒大一升生煮之令有半升在頓服

僧深方治卒心痛方 當歸二兩 芍藥一兩 桂心一兩

人參一兩 文子一作一枚 五物アハヒ吹咀以水七升煮取二升半分

服五服 又云治卒心痛附子丸方 人參二兩 桂心二兩

干薑二兩 蜀附子二兩 巴豆二兩

凡五物下篩蜜丸如大豆先食服三丸日一神良

新蘇方治心痛方 飲井花水二升 又方取契湯漬平



僧深方治卒心痛方

當歸二兩

夕藥一兩 桂心一兩

人參一兩 文子亦一枚

五物攻咀

以水七升煮取二升半

眼五服

又治卒心痛附子九方

人參二兩 桂心二兩

干薑二兩 蜀附子二兩 巴豆二兩

凡五物下篩蜜丸如大豆先食服三九日一神良

新錄方治心痛方

飲井花水二升

又方小兒熱湯漬手

足以老為度

又方燒秤錘令赤投二升酒中分二服

又方水服米粉一匙 集驗方治卒心痛方

桂心八兩 以水四升煮取一升半分再服 鑒真方治心痛

方大驗酢半升切葱白一莖和煎頓服立愈

范汪方治卒心痛一物桂心散方 桂心一兩 為散溫酒

服方寸上日三不飲酒以米飲服之

又方備急丸方巴豆一分 大黃二分 干薑二分 楊節異

治巴豆合丸如大豆有急取二三丸以水服之

如意方治卒心痛

書地作

五字撮中央以水一升

攪飲之 小品方解急蜀椒湯主寒病心痛如刺繞

吞錢痛腹中盡痛白汗出欲絕方 蜀椒三百枚

一方二百枚 附子一枚 梗米半升 干薑半兩 大棗廿枚

半豆十二枚 甘草一兩 凡七物以水七升煮取三升

湯成契服一升不啖老腹脹一升數用治心痛取良

千金方九痛丸主九種心痛一虫心痛二淫心痛三風心

痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛

九生來心痛方悉主之并治冷腫上氣落馬墮東方



一方二百枚 附子一枚 粳米半升 干薑半升 大棗十枚

半夏十二枚 甘草一升 凡七物以水七升煮取三升

湯成契服一升 不<sup>レ</sup>差 腹脹一升 數用治心痛 取良

千金方九痛丸主九種心痛一虫心痛二注心痛三風心

痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛

九生來心痛方悉主之并治冷<sup>レ</sup>腫上氣落馬墮東方

附子二升巴豆八升生狼毒一兩<sup>オホタラ</sup>人參一兩

干薑一兩食<sup>オホタラ</sup>菜<sup>オホタラ</sup>黃一升六味蜜和空腹服如梧子三

九卒中惡腹痛口不言二日一服連年積<sup>ハ</sup>冷流注心胃

者止服之好<sup>ヤム</sup>將息<sup>ヤム</sup>亦驗 又方龍白皮汁煮空腹服

之 又云凡暴心痛面無色欲死方以布裹衣<sup>ヤヤク</sup>塩如

彈丸燒令赤置酒中消服之 又云冬心痛方

心<sup>アハ</sup>憤<sup>アハ</sup>懷<sup>アハ</sup>微<sup>アハ</sup>痛<sup>アハ</sup>煩<sup>アハ</sup>逆<sup>アハ</sup>百<sup>アハ</sup>必<sup>アハ</sup>心<sup>アハ</sup>金<sup>アハ</sup>心痛如刀刺氣結<sup>アハ</sup>冬<sup>アハ</sup>葛<sup>アハ</sup>俞<sup>アハ</sup>

心痛<sup>アハ</sup>旬<sup>アハ</sup>痺<sup>アハ</sup>百<sup>アハ</sup>必<sup>アハ</sup>心<sup>アハ</sup>痛<sup>アハ</sup>冷<sup>アハ</sup>氣<sup>アハ</sup>上<sup>アハ</sup>冬<sup>アハ</sup>龍<sup>アハ</sup>頭<sup>アハ</sup>百<sup>アハ</sup>必<sup>アハ</sup>在<sup>アハ</sup>

心痛惡氣上<sup>アハ</sup>脇<sup>アハ</sup>急<sup>アハ</sup>痛<sup>アハ</sup>冬<sup>アハ</sup>通<sup>アハ</sup>各<sup>アハ</sup>五<sup>アハ</sup>十<sup>アハ</sup>心<sup>アハ</sup>痛<sup>アハ</sup>暴<sup>アハ</sup>絞<sup>アハ</sup>急<sup>アハ</sup>絕<sup>アハ</sup>欲<sup>アハ</sup>

死<sup>アハ</sup>冬<sup>アハ</sup>神<sup>アハ</sup>府<sup>アハ</sup>百<sup>アハ</sup>必<sup>アハ</sup>附<sup>アハ</sup>心<sup>アハ</sup>痛<sup>アハ</sup>暴<sup>アハ</sup>惡<sup>アハ</sup>風<sup>アハ</sup>冬<sup>アハ</sup>巨<sup>アハ</sup>關<sup>アハ</sup>心<sup>アハ</sup>痛<sup>アハ</sup>旬<sup>アハ</sup>脇<sup>アハ</sup>滿<sup>アハ</sup>期<sup>アハ</sup>

救急單驗方冷心痛方 吳茱萸一升桂心三兩當歸

三兩枳實九如梧子酒服廿九日漸加卅丸以知

為度 又云蠅心痛方 取<sup>三曲是源及</sup>蠅<sup>三曲</sup>糞<sup>三曲</sup>燒<sup>三曲</sup>令<sup>三曲</sup>赤<sup>三曲</sup>末<sup>三曲</sup>之酒

服驗 又云一切心痛方 生油半合溫服立愈

又方服當歸末方寸匕和酒服差 孟詵食<sup>レ</sup>注<sup>レ</sup>治<sup>レ</sup>惡<sup>レ</sup>痛

方酢<sup>レ</sup>研<sup>レ</sup>青木香服之



救急單驗方治心痛方 吳茱萸一升桂心三兩當歸

三兩檮末蜜丸如梧子酒服卅九日并漸加卅丸以知

為度 又云細心痛方 取蠅蟥糞燒令赤末之酒

服驗 又云一切心痛方 生油半合溫服立愈

又方服當歸末方寸匕和酒服老 孟詵食經治腹痛

方 酢研青木香服之

治腹痛方第四

病源論云腹痛者由府藏虛冷熱之氣客於腸胃

募原之間結聚不散正氣與邪氣交爭相擊故痛

具有冷氣搏於陰注者則腹痛而腸鳴謂之寒中

葛氏方治卒腹痛方 書舌上作風字 又方搗桂下

節服三方寸匕 苦參亦佳 干薑亦佳 又方食鹽一大

握多飲水送之當吐即差 又方掘土作坎以水滿坎中

煎攪取汁飲之 又方令人騎其腹溺香中之

又方米粉一升水二升和飲之 如意方治卒腹痛術

書帛作兩蜈蚣相交吞之 今案葛氏方用之

醫門方治腹痛方 桂心三兩切以水一升八合煮得八

合去滓頓服 元桂心煮干薑之佳 范汪方云當歸湯主寒

腹痛方 當歸三兩桂心三兩甘草二兩干薑三兩

凡四物水八升煮得三升服一升日三服 又當歸

九 治寒腹痛如刀刺方 當歸三分芍藥三分黃

芩四分桂心一分 凡四物治痢和蜜丸如梧子服五

先食日三



腹痛方 當歸三升 桂心三升 甘草二兩 干薑三兩

凡四物水八升 煮得三升 服一升 日三 又 當歸

九 治寒腹痛如刀刺方 當歸三升 芍藥三升 黃

芩四升 桂心一升 凡四物治痢和蜜丸如梧子服丸

先食日三

千金方 溫脾陽治腹痛 膈下繞結 遠膈不止方

當歸五升 干薑五兩 附子三兩 甘草二升 大黃五兩

人參三兩 芒消三兩 七味以水七升 煮取三升 分三服 日三

又方 治腹痛方 灸巨闕穴在鳩尾下一寸

又方 灸水穴在膈上一寸 又方 灸中極穴在膈下四寸

治心腹疼痛方第五

病源論云 心腹疼痛者 由府藏虛弱 風寒客於其間

故也 耶氣發作 与正氣相擊 上衝於心 則心痛 下攻

於腹 則痛 上下相攻 故心腹絞痛 氣不得息 葛氏

方云 凡心腹疼痛 若非中惡霍亂 皆是宿結冷積 所

為也 治心腹俱脹 痛短氣 欲死 或已絕方 桂三升

切以水八升 煮得八合 去滓 煩服 无桂者 干薑五升

千金方 治心腹卒絞痛 如刺 兩脇支滿 煩悶 不可堪 思

方 高梁薑五升 原朴二兩 當歸二兩 桂心二兩

四味 切以水八升 八合 煮取一升 八合 分三服 一服六合

日二 若一服痛止 便停 不須更服 若人強者 一服一升

為再服 日二 小品方 治寒疝心腹疼痛方 夫寒疝腹中

痛 逆冷 手足不仁 若一身疼痛 多刺 諸藥所不能治者



千金方治心腹卒絞痛如刺兩脇支滿煩悶不可堪忍

方 高粱薑五兩 原朴二兩 當歸二兩 桂心二兩

四味切以水八升八合煮取一升八合分為三服一服六合

日二若一服痛止便停不須更服若人強者一服一升

為再服日二 小品方治寒疝心腹痛方夫寒疝腹中

痛逆冷手足不仁若一身疼痛多刺諸藥所不能治者

桂枝湯加烏頭湯主之 桂肉三兩 生薑三兩 甘草

二兩 芍藥三兩 大棗十二枚 烏頭五枚 破之以蜜一升 煎

凡五物以水七升煮取二升半內蜜煎服五合日三

搗要方療心腹久寒卒發欲如鬼刺欲死湯方吳茱

萸二升 香豉三合 生薑四兩 右以好酒五升煮取二

升分服下喉杯未去口病便愈 令咽水 又方療在

心腹痛不可忍方 右取桃東引枝削去蒼皮取白

皮一握以水二升煮取半升服之 醫門方療卒

心腹痛方 厚朴三兩 桂心二兩 以水三升煮取一

升服之若卒痛如刺者但煮桂汁飲之佳 僧深方治

惡氣心腹欲死方 芍藥一兩 甘草二兩 桂心一兩

當歸二兩 凡四物水五升煮取二升分再服

耆婆方治人心腹絞痛不心方 生薑十兩 桂心三兩

甘草三兩 人參二兩 四味切以水一斗煮取二升分三服

治心腹脹滿方第六

病源論云心腹脹者脾虛而耶氣客之乘於心脾故也

葛氏方治卒苦心腹煩滿 又胃弱痛欲死方



當歸二兩

凡四物水五升煮取二升分再服

耆婆方治人心腹絞痛不心方 生薑十兩 桂心三兩

甘草三兩 人參二兩 四味切以水一斗煮取二升分三服

治心腹脹滿方第六

病源論云心腹脹者脾虛而耶氣客之乘於心脾故也

葛氏方治半苦心腹煩滿 又胃脘痛欲死方

以契湯令的ハタカケラ尔漬手足冷復ヒタセ秘方又方炙乳下一寸

七疔 又方搗香葉汁服一二升

又方判薑ツイ ツシクノ取根煮取汁服三升 桂要方備急丸療

忽ヒト然心腹脹滿急痛氣絕大小便不通方 大黃五兩

干薑二兩 巴豆三兩 去心ヒ薑世消三兩

右蜜丸平曉飲服四丸不利セハセ更加一二丸取得ヒ五

度利モシ如不心取醋ヒノ飲心之新錄方治心腹煩滿方

桃人去皮搗如泥契酒服如棗二枚日三 又煩滿シクセ吐

逆方 生薑一斤 合皮切搗取汁溫服之 又方生薑シクセ搗

取汁服一合二合 醫方云凡患ハシクセ脹滿ハシクセ類以利

藥下之心腹中痛シクセ妨不去氣又築心者鑲胃中虛ヨリ氣

上衝心故也 人參三兩 甘草三兩 炙橘皮二兩アハハ來升

顆水七升煮取二升半ヒ降ヒ溫三服若心忪アハハ加伏苓三兩

又云腹脹滿不能服藥導之方 取獨頭蒜ヒトイカリノヒル燒令熟

去皮及契ナカラ以薄綿裹內下部佳ヒタセ冷易之 又方暖生薑

削綿裹內下部中冷易之佳 耆婆方治人腹脹痛方

厚朴三兩 高梁薑三兩 切以水三升煮取一升半シクセ少



上衝心故也 人參三兩 甘草三兩 枳實二兩 桑葉

顆水七升煮取二升半去滓分溫三服若心忪加伏苓三兩

又云腹脹滿不能服藥導之方 取獨頭蒜燒令熟

去皮及契ナカラ以薄綿裹內下部佳ヒヨカリノヒル冷易之 又方暖生薑

削綿裹內下部中冷易之佳 耆婆方治人腹脹痛方

厚朴三兩 高梁薑三兩 切以水三升煮取一升半少

契飲之乃止ヤム 僧深方云厚朴湯治腹滿數十日脉浮

數食飲如故方 厚朴半斤 枳實五枚 大黃四兩

凡三物以水一斗二升煮取五升內大黃 薇火煮令

得三升先食服一升日三

本草云可梨勒水摩ミチ或散水服之 藥散本草注

云檳榔子搗末服之 孟諸食經云薤可作宿殖

空腹食之

### 治半腰痛方第七

病源論云腎主腰腎經虛損風冷乘之故腰痛也

又耶客於足大陰之絡令人腰痛引小腹ホンネ不可以作息

凡腰痛有五一日少陰二日腎也十月万物陽氣皆傷

是以腰痛二日風痺風寒著腰是以腰痛三日腎虛

使用傷腎是以腰痛四日槩腰墮墜傷腰是以腰

痛五日寢卧濕地是以腰痛 養生方云飲人食勿

即卧么作氣病令腰痛疼 又云菱多則腎轉

腰痛 千金方松仲酒治五種腰痛衣來寄生杜

仲 庶茸桂心 四味分等末服方寸匕日三



是以腰痛二日風痺風寒着腰是以腰痛三日腎虛

後用傷腎是以腰痛四日緊腰墮墜傷腰是以腰

痛五日寢卧濕地是以腰痛養主方之飲人食勿

即卧么作氣病令腰痛疼又主寒多則腎轉

腰痛千金方松仲酒治五種腰痛家來寄生杜

仲庶茸桂心四味分等末服方寸匕日三

又方治腰脊疼不隨么方庶茸去上皮取白者

葵黃末酒服方寸匕日三特禁生食餘不禁新者

良陳者不服角中黃處亦不中服大之神良今案葛氏方

庶茸  
尤佳

錄驗方治腰脚疼不可忍不能立胡麻散方取胡

麻葵令香於臼內搗碎即以沙羅節之數之蒨之

若不數蒨即脂出不可蒨合皮日一服每服小升服

盡藥斗三升永無腰脚之疼此藥辟穀不飢多

服即減食漢以酒及飲蜜湯羹汁亦並得服元禁

小品方云葵腰痛法令病人正蹲立以竹杖注地

度至音以度注地背正矣脊骨上隨年壯矣竟藏

竹分令人得之矣丈夫痔下血及脫肛不入及息

下長泄利婦人女子月崩去血乍心乍發及帶下

淋瀝長者赤白雜汁皆灸此又使兩傍各一寸復

灸之為橫三穴間一寸也又灸腰目小耶在尻上左

右陷處是也葛氏方治卒腰痛不得俯作方

正倚立竹以度其人足下至脊斷竹又以度之背

正倚立竹以度其人足下至脊斷竹又以度之背



下長泄利婦人女子月崩去血乍心乍發及滯下

淋瀝長者赤白雜汁皆矣此又使兩傍各一寸復

灸之為橫三穴間一寸也又灸腰目小耶在尻上左

右陷處是也葛氏方治卒腰痛不得俯作方

正倚立竹以度其人足下至脊斷竹又以度之背

後當脊中灸竹上頭處退年壯畢歲竹勿令人

得之又方去窮骨上一寸灸七壯其左右各一

寸灸七壯范汪方治腰卒痛物急不得喘息者

醉罷得之欲死大豆紫湯方大豆一斗熬令

好酒二斗二物合煮令熟沸隨人多少服令醉

醫門方療卒腰痛不得轉側方鹿角一枚長五六

寸截之燒鹿角令赤內酒中浸之須臾又燉還內酒

中如此數度破碎便即浸之一宿平晨空腹飲令醉愈

治緊腰方第八

病源論云緊腰者謂卒然損傷於腰而致病也此由

損血搏於腰脊所為久不已令人氣息少而无顏色

損腎之故也葛氏方云概腰者是及腰忽動轉

而梳之治概腰痛欲死方生葛根削之爵咽其汁

多之蓋佳又方生地黄搗絞取三升煎得二升內蜜

一升日三服不差更作又云治及腰脊背痛方搗

桂下篩三升許以苦酒和以墜痛上千復墜又方

炙足踵白蜜際三壯范汪方治概腰方寄生來

上者煮首連心法丹分等為散服方寸匕日三又方桑



而梳之治概腰痛欲死方 生葛根削之爵咽其汁

多之益佳 又方生地黄搗绞取三升煎得二升內蜜

一升日三服不卷更作 又云治及腰脊背痛方 搗

桂下篩三升許以苦酒和以墜痛上千復墜 又方

冬足踵白密際三味 范汪方治概腰方 寄生來

上者 鹿茸桂心牡丹分等為散服方寸匕日三又方桑

足跟白肉際三九 又方桑腰目十九

治腎著腎痛方第九

病源論云腎經虛則受風冷內有積水風相搏漬

於腎氣內著不能宣通故腎痛其病之狀身

驢冷腰腹重如帶五千錢狀如坐於水形狀如水不渴

小便自利食如故久變為水病

千金方云腎著之為病其人身驢重腎中冷所以如

水洗狀又不渴小便自利食飲如故是其證也

作勞汗出衣裏冷濕久之故得也腰以下冷痛腹重如

帶五千錢腎著湯主之 甘草一兩 干薑二兩 伏苓

四兩 朮四兩 四味水五升煮取三升分三服腎中即

溫 今案集驗方元本 僧深方伏苓湯治腎著之為病從

腰以下冷痛而重如五千錢腹腫方

乾膝八兩 白朮四兩 伏苓四兩 干薑二兩 甘草二兩

凡五物以水一斗煮取三升去滓內饘令得四服

治肝病方第十

病源論云肝氣盛為亟有餘則病自赤而脇下痛



溫 今案集驗方元本 僧深方伏苓湯治腎暑之為病後

腰以下冷痛而重如五千錢腹腫方

飴膠八兩 白朮四兩 伏苓四兩 干薑二兩 甘草二兩

凡五物以水一斗煮取三升去滓內飴令烊分四服

治肝病方第十

病源論云肝氣盛為血有餘則病自赤兩脇下痛

引小腹善怒氣逆則頭眩耳聾不聰頰腫是為

肝之實也則寫之肝氣不足則病目不明兩脇物急

筋牽不得大息凡甲枯面青善悲恐如人將捕之是

為肝氣之虛也則宜補之 千金方治肝虛寒脇下

痛脹滿氣急眼昏濁視不明攢柳湯方

母薑七兩 附子七兩 攢柳口伏苓三兩 桔梗四兩

橘皮三兩 白朮四兩 吳茱萸五合 桂心三兩 九味

以水九升煮取三升去滓分三服 又治肝實契目

痛胃滿急塞寫肝前胡湯方 前胡三兩 秦皮

三兩 細辛三兩 艾子人三兩 黃芩三兩 蜀升麻三兩

薤白三兩 碎 決明子三兩 苦竹葉一升切 車前子切一升

芒消三兩 十一味以水九升煮取三升去滓下芒消分三

服 錄驗方補肝湯治肝氣不足脇下滿筋急不得

大息厥逆心脚中痛兩目不明面青方 牛黃一兩

烏頭四兩 栝子四兩 大棗十枚 龍膽四兩 凡五物切以

水五升煮取一升去滓一服令盡

僧深方寫肝湯治肝氣實目赤若黃脇下急小便



芒消三升 十一味以水九升 煮取三升 去滓 下芒消 分三

服 錄驗方補肝湯治肝氣不足 脇下滿 勸急不得

大息 厥逆 驚心 胸中痛 兩目不明 面青方 牛黃一兩

烏頭四升 栝子四升 大棗十枚 龍膽四兩 凡五物切以

水五升 煮取一升 去滓 一服 令盡

僧深方 寫肝湯治肝氣實 目赤若黃 脇下急 小便

難方 人參三升 生薑五升 黃芩二兩 半夏一升 洗

甘草二升 大棗十枚 凡六物切水五升 煮取半 復令三

四沸 內藥後 內薑 煮取二升 去滓 分二服 羸人 三服

治心病方 第廿一

病源論云 心氣盛為神 有餘則病 胃內痛 脇支滿

膺背膊髀間痛 兩臂內痛 善驚 不安 是為心氣之

實也 則宜寫之 心氣不足 則胃腹相引 痛驚悸 恍

惚 少顏色 舌本強 善憂悲 是為心氣之虛也 則宜補之

千金方治心虛 寒心中滿 脹悲憂 或夢山丘 平澤 半

夏補心湯方 半夏六兩 洗 宿薑三兩 伏苓三兩

白朮四兩 防風二兩 桂心三兩 遠志二兩 檮皮三兩

九味切以水一斗 煮取三升 分三服

錄鈴方治心上虛 契胃中時痛 口生瘡 四大羸 色少

氣方 莖胡四升 升麻三升 黃芩三升 生地黄

八兩 夕葉四升 地骨白皮五升 枳實三兩 炙 生

薑三兩 竹葉二兩

凡九物切以水八升 煮取二升 七分 分三服



九味水一斗煮取三升分三服

錄鈴方治心上虛契胃中時痛口生瘡四大羸色少

氣方 苤胡四兩 升麻三兩 黃芩三兩 生地黄

八兩 芍藥四兩 地骨白皮五兩 枳實三兩 炙

薑三兩 竹葉二兩

凡九物切以水八升煮取二升七分三服

耆婆方治人心中契風見鬼親合陰陽且便少

黃瘦不能食日轉羸方

龍膽三分 苦參三分 右二味為散以白米飲一服一錢

日二服忌猪羊酒麵

治脾病方第十二

病源論云脾氣盛為形有餘則病腹脹澼不利身

重口苦飢足不收行善掣脚下痛是為脾氣之實也

則宜瀉之脾氣不足則四支不用後世食不化逆

勝為是為脾氣之虛也則宜補之

脾方療脾虛寒勞損氣脹噎滿食不下通噎消

食方 猪膏三升 宿薑汁五升 吳茱萸一升 白朮

一升 檉葉莫等二物為散內薑汁膏中煮取六升燂酒

進方寸匕日再服 千金方治脾實契古本強直或

夢歌樂而體重不能行寫契湯方 苤胡三分

伏苓三分 玄參二分 大青二分 龍膽三兩 細辛三

杏人四兩 芒消三分 苦竹葉切一升 九味水九升

煮取三升分三服



進方寸匕日再服 千金方治脾實契古本強直或

夢歌樂而體重不能行寫契湯方 茈胡二分

伏苓三分 玄參二分 大青二分 龍膽三分 細辛二分

杏人四分 芒消三分 苦竹葉切一升 九味水九升

煮取三升分三服

搓要方療脾熱內熱肩膝渴多腫身重方以生地黄

五兩搗之以水絞取汁漬梅蜜和服之

又方取芥菜汁一升一服 又方麥門冬汁服之

廣洛方主脾胃中熱渴欲得飲冷水不下食方

伏苓四兩 甘草二兩 石膏五兩 地骨白皮三兩

第根切一升 切以水八升煮取二升五合絞去滓

分溫三服忌熱麵契肉海藻猪蒜

僧深方溫脾湯治脾氣不足虛弱下利上入下出方

干薑三兩 一人參二兩 附子二兩 甘草三兩 大黃

三兩 凡五物以水八升煮取二升半分三服應

得下去毒實甚良

治肺病方第十三

病源論云肺氣盛為氣有餘則病喘欬上氣轉筋痛

汗出尻陰股膝端胫足皆痛是為肺氣之實也則宜

寫之肺氣不足則少氣不能報息耳聾啞乾是為

肺氣之虛也則宜補之

千金方治肺虛寒之小腸物急腰痛羸瘠百病達

中湯方 大棗亦散 干薑三兩 以藥二兩 甘草三兩



病源論云肺氣盛為氣有餘則病喘欬上氣轉筋痛

汗出尻陰股膝踠胫足皆痛是為肺氣之實也則宜

寫之肺氣不足則少氣不能報息耳聾啞乾是為

肺氣之虛也則宜補之

千金方治肺虛寒之小腸物急腰痛羸瘠百病達

中湯方 大棗半枚 干薑三兩 芍藥二兩 甘草三兩

桂心三兩 五味水八升煮取三升去滓內枳八兩煮三

沸分三服

又云治肺實則胃喘作息泄氣除契方

枸杞根皮二升 白前三兩 石膏八兩 杏仁三兩 橘皮五兩

白朮五兩 赤蜜七合 六味水七升煮取二升去滓下蜜

煎兩三沸分三服

治腎病方第十四

病源論云腎氣盛為志有餘則病腹脹食泄體腫

喘欬汗出面目黑小便黃是為腎氣實也則宜寫之

腎氣不足則厥腰背冷胃內痛耳鳴苦龍耳是為腎

氣之虛也則宜補之 千金方治腎虛寒陰萎脊

腰痛身重緩弱言音混濁陽氣損絕方

生地黃五斤 干絳容八兩 白朮八兩 巴戟天八兩 麥門

冬八兩 伏苓八兩 甘草八兩 牛膝八兩 五味子八兩

車前子五兩 杜仲八兩 干薑五兩 十二味為散

食後酒服方寸匕日三

又云治腎實契方 滿四支心黑耳聾夢腰脊離解夢



腰痛身重。緩弱言音混濁。陽氣煩絕方。

生地黃五斤唐 續命八兩 白朮八兩 巴戟天八兩 麥門

冬八兩 伏苓八兩 甘草八兩 牛膝八兩 五味子八兩

車前子五兩 杜仲八兩 干薑五兩 十二味為散

食後酒服方寸匕日三

又治腎實契脹滿四支正黑耳聾夢腰脊離解夢

伏水等氣急寫腎陽方 大黃三兩以水一升蜜器中宿漬碎如雀頭大

生地黃五兩 甘草二兩 伏苓三兩 葱白八兩 昌蒲五

兩 黃芩三兩 玄參四兩 細辛二兩 芒消三兩

十味以水九升煮八味取二升五合去滓別漬大黃

內藥中更煮取二升三合去大黃滓下地黃汁微

火煎一兩沸下芒消分三服

耆婆方治腎氣虛則夢使人見舟船溺人冬時夢見

伏水中及在水行若有恐畏惡人見腎氣盛則夢見

腰脊兩解不屬不連厥氣客於小腹則夢聚邑街衢

方 秦膠イカリモ 石斛イハクシ 澤野ナナヰ 防風ハテカキ 人參各一分 伏苓 黃芩

干地黃 遠志唐 各八分

十味切搗篩為散以酒服方寸匕日二

治大腸病方第十五

病源論云大腸氣盛則為有餘則病腹內切痛如錐

刀刺無休息胃背寒痺寧息是為大腸之氣實也

則宜寫之 大腸氣不足則寒氣客之善世

是為大腸氣之虛也則宜補之



十味切搗篩為散以酒服方寸匕日二

治大腸病方第十五

病源論云大腸氣盛則為有餘則病腹內切痛如錐刀刺無休息力事有脅背寒痺痛也寧志是為大腸之氣實也

則宜瀉之

大腸氣不足則寒氣容之善世

是為大腸氣之虛也則宜補之

千金方治大腸虛寒利下青白ハクセ腸虛鳴相逐黃連補

湯方 黃連四兩 伏苓三兩 芍藥三兩 酸石榴皮

五具 地榆五兩 伏龍肝カクハチ鷄子一枚 六味切水七升煮

取二升五合去滓下伏龍肝屑攪攪調分三服又治

大腸實熱腸脹不通口生瘡生薑泄腸湯方

宿薑三兩 橘皮三兩 大棗十四枚 青竹茹三兩

生地黃十兩 桂心一兩 黃芩三兩 艾子人三兩 伏苓

二兩 白朮三兩 芒消二兩 十一味切水七升煮取三升

去滓下芒消分三服

治小腸病方第十六

病源論云小腸氣盛為有餘則病小腸契燠竭干

澀少腹脹是為小腸之氣實也則宜瀉之小腸不

足則寒氣容之而腸病驚跳不言乍來乍去是

為小腸氣之虛也則宜補之

千金方治小腸虛寒痛下赤白腸滑腹中懊憹

補湯方 干薑三兩 當歸四兩 黃蘗四兩 地榆皮

四兩 黃連三兩 阿膠三兩 石柏皮三兩



治少腹脹是為小腸之氣實也則宜導之小腸不  
足則寒氣客之而腸病驚跳不言乍來乍去是

為小腸氣之虛也則宜補之

千金方治小腸虛寒痛下赤白腸滑腹中懷懷

補湯方 干薑三兩 當歸四兩 黃蘗四兩 地榆皮

四兩 黃連三兩 阿膠三兩 石柏皮三兩

七味水七升煮取二升五合去滓下膠煮稀分三服

又治小腸實熱腹中瘕紫胡瀉湯方

紫胡三兩 橘皮三兩 黃芩三兩 澤瀉三兩 枳實三

兩 旋花三兩 升麻三兩 生地黃切二升 芒消三兩

九味切以水一斗煮取三升去滓下芒消分三服

治腸病方第十七

病源論云腸氣盛為有餘則病腹內胃不安身軀

習是為腸氣之實也則宜導之腸氣不足其氣上

溢而口苦善大息噎宿汁心澀如人時補之登中介

穀啖是為腸氣之虛也則宜補之

千金方治腸府實熱精神不守寫熱半夏干薑水

湯方 半夏三兩 酸棗五合 黃芩一兩 遠志二兩

伏苓二兩 宿薑三兩 生地黃五兩 凡八物細切取長

流水五斗先煮秫米令蟹目沸揚之三升過澄清

取六升煮藥取二升分三服

治胃病方第十八

病源論云胃氣盛為有餘則病腹腹脹氣滿是為



湯方半匁三兩酢漿五合黃芩一兩遠志二兩  
伏苓二兩宿薑三兩生地黃五兩凡八物細切取長  
流水五斗先煮枳米令蟹目沸揚之三斗過澄清  
取六升煮藥取二升半分三服

治胃病方第十八

病源論云胃氣盛為有餘則病腹腹脹氣滿是為  
胃氣之實也則宜瀉之胃氣不足則飢而不食穀  
食泄瀉遂是為胃氣之虛也則宜補之

千金方治胃虛冷少氣口苦身體無澤補胃湯方

防風二兩栝子人二兩吳茱萸三兩細辛二兩甘草一

兩桂心二兩橘皮二兩芎藭二兩人參三兩凡九味

切以水一斗煮取三升分三服又治胃實胃實胃實湯

方文子人三兩芍藥四兩白朮五兩伏苓二兩生地

黃汁一升夜干三兩升麻三兩赤蜜一升

八味切以水七升煮取一升五合去滓下地黃煮雨

沸次下蜜煮取三升分三服老小以意

治膀胱病方第十九

病源論云五穀五味之津液悉歸於膀胱氣化分入

而脈以成骨髓也而津液之餘者入肥則為小便不通

小腹偏腫痛是為膀胱氣之實也則宜瀉之勝

胱氣不足則寒客之胞滑小便數而多也面黑是

膀胱氣之虛也則宜補之千金方云旁光

病者少腹滿腫而痛以手按則欲小便而不得



血脉以成骨髓也。而津液之餘者入肥。則為小便不通。  
小腹偏腫痛。是為膀胱氣之實也。則宜寫之。勝  
膀胱氣之虛也。則宜補之。千金方云。勞光

病者少腹滿腫而痛。以手按則欲小便而不得。

又云。治勞光腎冷。飢不欲食。面黑如炭方。慈石六兩

黃耆三兩 松中四兩 白石莫五兩 五味四兩 伏苓三

兩 木五兩 七味水九升 煮取三升 分三服。又云。治勞光

實。契方。艾子人三兩 石膏八兩 伏苓三兩 淡竹葉

切一升 生地黃切一升 蜜一升 知母三兩 七味水七

升 煮取二升 去滓下蜜 煮兩沸 分三服 須臾和芒消

三兩

治三焦病方。第廿

病源論云。三焦盛為有餘。則脹氣滿於皮膚內。輕然

而不牢。或小便澀。或大便難。是為三焦之實也。則宜寫

之。三焦氣不足。則寒氣客之。病遺尿。或泄利。或胃

滿。或食不消。是三焦之氣虛也。宜補之。

千金方云。三焦病者。脹氣滿。小腹尤堅。不得小便。窘

急。溢則為水。田則為腹脹。又云。治上焦虛寒。短氣

語聲不出。黃耆理中湯方。黃耆二兩 桂心二兩

丹參四兩 桔梗三兩 乾薑三兩 五味子三兩 伏苓

三兩 甘草三兩 杏仁四兩 芎藭三兩 十味切以水



千金方云三焦病者脹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則為水田則為腹脹又云治上焦虛寒短氣

語聲不出黃耆理中湯方 黃耆二兩桂心二兩

丹參四兩桔梗三兩乾薑三兩五味子三兩伏苓

三兩甘草三兩杏仁四兩芍藥三兩十味切以水

九升煮取三升分三服又云治上焦實契腹滿

而不欲食或食先噎而後下時後胃痛麥門冬

理中湯方生麥門冬一升生薑四兩甘草二兩人參

三兩伏苓二兩橘皮三兩竹茹一升生蘆根切升

尊心五合藥米一升白朮五兩姜薤三兩

十二味切水一斗五升煮取三升分三服

又云治中焦實契開塞上下不通障絕開格不吐不

下腹數急大黃寫契開格通障絕九味湯方

蜀大黃三兩切水一升黃耆三兩澤陽三兩升麻三兩

零羊角四兩艾子人四兩生地黃汁一升生玄參八兩

芒消三兩九味以水七升煮八物取二升三合下大黃更

煎數沸飲去黃澤下芒消分三服

又云治中焦虛寒洞泄下利或因霍亂後寫黃白無

度腹中虛痛黃連煎方金色黃連四兩黃蘗三兩

當歸三兩厚朴三兩乾薑三兩酸石榴皮四貝地榆

四兩阿膠四兩八味以水九升煮七物取一升去滓下

阿膠更煎取烱分三服又云治下焦虛寒損或

更薄後見此為或利下或不利好因勞冷而



又治中焦虛寒洞泄下利或因霍亂後寫黃白無

度腹中虛痛黃連莖方 金色黃連四兩黃蘗三兩

當歸三兩 厚朴三兩乾薑三兩 酸石榴皮四兩 地榆七七九

四兩阿膠二九四兩 八味以水九升煮七物取一升去滓下

阿膠更煎取烱トケム分三服 又治下焦虛寒損或

便轉後見血此為近血或利下或不利好因勞冷而

發續新止血湯方 續新三兩 當歸三兩 干薑四兩

甘草一兩乾地黃四兩桂心三兩 六味切以水九升煮

八物取三升五合去滓下阿膠更烱取膠トイ盡下補

黃分三服 又治下焦契大少便利不通紫胡泄

通塞湯方

紫胡ノセリ三兩 黃芩三兩 橘皮三兩 澤駉ナナキ三兩

文子人四兩 石膏六兩 碎 零羊角三兩 炙 生地黄

切一升 香豉一升 煮 芒消三兩 十味以水斗

煮九物取三升去滓下芒消分三服

治氣病方第廿一

千金方治氣極虛寒皮毛焦津液不通鼻旁百病

氣損黃耆湯方 黃耆ヤハラクセ四兩 人參二兩 干姜十枚去板

生薑八分 白朮二兩 桂心二兩 六味切以水八升煮取三

升分四服 又理氣丸治氣不足方 杏仁一兩 益

智子二兩 廣薑二兩 桂心一兩 四味丸如梧子未食服

三丸以知為度

治脈病方第廿二



氣損黃耆湯方 黃耆四兩 人參二兩 干姜十枚

生薑八分 白朮二兩 桂心二兩 六味切以水八升煮取三

升分四服 又之理氣丸治氣不足方 杏仁一兩 益

智子二兩 廣薑二兩 桂心一兩 四味丸如梧子未食服

三丸以知為度

治脈病方第廿二

千金方治脈虛驚跳不定乍來乍去主小腸府寒補

調中防風丸方 防風十二分 桂心十二分 通草十二分

伏神十二分 遠志十二分 甘草十二分 人參十二分 麥門冬

十二分 白石英十六分 九味檮蕪為散白蜜和丸如梧子

酒服十丸日再加之至亦為劑又之治脈實洪滿主心實

病并麻湯方 蜀椒麻三兩 艾子人三兩 生地黄切一升

子苓三兩 澤陽三兩 淡竹葉三兩 芒消三兩

七味以水九升煮取三升去滓下芒消分三服

治筋病方第廿三

刪繁方治筋虛實暴橫絕極或因霍亂轉動腹

滿並轉痛或因服藥吐利過甚脚平虛轉腹轉痛

人參湯方 人參二兩 厚朴二兩 葱白一庖 白朮

兩 藜一把 五物切以水五升煮取二升去滓分再服

又之治轉筋霍亂後因而筋轉方 取絮巾若綿灸

燬以縛筋上 又之胞轉筋急方 白朮四兩 香豉

一升 艾子人二兩 榆白皮三兩 子苓三兩 通草二兩

伏苓二兩 七物切以水七升煮取三升去滓分三服



一握也

人參湯方 又為二兩 厚朴二兩 葱白一握 白芍

雨 藜一把 長三寸 五物切以水五升煮取二升去滓分再服

又云治轉筋霍亂後因而筋轉方 取絮巾若綿灸

熨以縛筋上 又云胞轉筋急方 白朮四兩 香豉

一升 葵子人二兩 榆白皮三兩 子芩三兩 通草二兩

伏苓二兩 七物切以水七升煮取三升去滓分三服

又云治轉筋陰囊卵縮入腹之中絞痛從交接極

損所為方

取化子一頭 杖撞卅六下 放於中逐之使啼極刺腸

下取血一升以酒一升共和飲之若無酒單酒以好切金

冷澱也 又云治交接損縮卵痛方 燒婦人月經

衣服方寸匕 已上千金方同之 又云治轉筋十指筋急不得

屈申別法 灸千踝上七炷大良 又云治轉筋脛骨

痛不可忍方 灸屈膝下廉橫筋上三炷

又云轉筋方 灸湧泉、在腳心下當母

指大筋是灸七炷 又方灸大都、在足母指大

節內側白肉際七炷 又云腹脇轉筋方 灸膺上

一寸十四炷 又云治筋絕方 雙髀足髓熱內瘡中

筋即續矣

千金方治筋實極手足爪甲或青或黃或黑四者筋急

煩地黃葉方 地黃汁三升 生葛汁一升 生玄參汁升

大黃二兩 艾子三兩 升麻三兩 石膏五兩 芍藥四兩

麻黃三兩 犀角三兩 干味水七升 煮七物取二升去滓

也黃汁兩升 弗次下葛汁等藥取三升三服



筋即續矣

千金方治筋實極手足爪甲或青或黃或黑或赤筋急

頑地黃<sup>九</sup>方地黃汁三升生葛汁一升生玄參汁升

大黃二兩艾子三兩升麻二兩石膏五兩久藥四兩

麻黃三兩犀角三兩干味水七升煮七物取二升去滓

地黃汁兩沸次下葛汁等藥取三升三服

治骨病方第廿四

那繁方云凡骨虛實之應主于腎膀胱若其府藏

有病從骨生熱則應藏寒則應府凡骨虛者疼

不安好倦骨實者苦煩熱又云治骨實苦煩熱

鷄子白<sup>方</sup>藥方通四肘用鷄子七枚<sup>和用取白</sup>生地黃汁一升

麥門冬汁三合赤蜜一升凡四汁相和攪調微火上

煎之三沸分三服桂要方療骨虛勞冷骨節疼

痛無力致二升地黃八兩再過<sup>並</sup>曝乾從食後以酒

一升服之再治虛熱

治髓病方第廿五

那繁方云凡髓虛實之應主于肝膽若其府藏有

病從髓生熱則應藏寒則應府凡髓虛者病

惚不定<sup>此</sup>髓實者勇<sup>此</sup>幹又云治髓實勇<sup>此</sup>驚<sup>此</sup>熱<sup>此</sup>主

肝熱紫胡<sup>方</sup>散泄湯方紫胡三兩升麻三兩黃芩三兩

澤<sup>方</sup>馬四兩細辛三兩枳實三兩淡竹葉切一升艾子

人三兩生地黃切一升芒消凡十物以水九升煮取三

升去滓下芒消分三服

千金方治髓虛痛<sup>此</sup>惚不







昌補根葉生二升 凡五物水一石五斗 煮取汁 煮取汁 煮取汁

大瓮器 貯瓮上 作少竹床子 置瓮人身坐床中 四面

周迴 持麋席圍身上 以衣被蓋覆 若氣急時 用孔射

中泄氣 取對通方 樓汗可作兩食久 汗如牛三日 差還

燭葉足汗用之 若氣裏不過 勢氣下 置炭火也 非但

治寒法是皮膚一切勞冷 蓋好治之

又云治皮膚主肺病 勢氣所加 文子藥方

文子人三兩 生地黃切一升 枳實三兩 石膏八兩 大青

三兩 杏仁三兩 淡竹葉切一升 紫胡三兩 生玄參五兩

甘消三兩 凡十物切以水九升 煮取三升 去滓下芒消

平旦分三服 已上千金方同之

治定病方第七

郡繁方云 凡定虛實之應 主脾胃 若其府藏有病 從

肉生 勢則應藏寒 則應府

凡定虛者 生不平 席多危動 定實者 生不平 動氣

又云治定虛 生不平 席好動 主胃病 寒氣所加 五茄

方 通四時用 五茄皮二升 苟杞皮二升 干地黄八兩 丹參八

兩 枳仲一斤 干薑四兩 附子三兩 炮鍾乳床一斤 研

凡八物 吹咀 橙子貯之 清酒二斗 漬之三宿 一服七

合日再服 又云治定實 生不平 席不動 喘氣主脾病 勢

氣格半夏湯除喘方 通四時用 半夏八兩 洗宿薑八兩

細辛三兩 杏仁五兩 橘皮四兩 麻黃三兩 石膏七兩

碎 夜干二兩 凡八物切水九升 煮取三升 去滓分三服

負利下如生有三月



咳喘麻栲  
之義也  
栲之如大  
豆也

象凡八物吹アヘタチ橙子貯之清酒二斗漬之三宿一堅

合日再服又治モハ定實生平ホソクア席不動喘氣主脾病契

氣拾半夏湯除喘方ホソクア通四時用半夏八兩ホソクア洗宿薑八兩

細辛三兩アラノネクセ杏仁五兩カハネクセ橘皮四兩シラキ麻黃三兩シラキ石膏七兩

碎ワラハル夜干二兩ワラハル凡八物切水九升ワラハル煮取三升去滓分三服

須利下加芒消三兩

腎心方卷第六